



## PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN SEXUAL EN USUARIAS DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOSPITAL GINECO OBSTETRICIA/UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO 13

MARTÍNEZ PALOMINO ERICKAL. GUERRERO MARTÍNEZ, ALMA ITALIA<sup>2</sup>

<sup>1</sup>FACULTAD DE MEDICINA, UNAM. [erypalomino@yahoo.com.mx](mailto:erypalomino@yahoo.com.mx)

<sup>2</sup>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. [Italia.guerrero@imss.gob.mx](mailto:Italia.guerrero@imss.gob.mx)

### INTRODUCCIÓN

Disfunción sexual abarca las diversas maneras por las cuales una persona es incapaz de participar en una relación sexual como lo hubiera deseado. Una alteración en el ámbito sexual genera un impacto negativo en la calidad de vida, salud mental y física generando alto costo en el sector salud. La asociación entre función sexual y anticoncepción es controvertida, supone que la disminución de testosterona libre que genera alteraciones en la secreción vaginal, dispareunia y disminución de la libido, traduciéndose esto en un factor para desarrollo de otras patologías.

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el 2019 se realizaron 296,630 consultas de las cuales 3322 fueron de planificación familiar, lo que significó una incidencia anual de anticoncepción del 3.34%, siendo ésta población susceptible de desarrollar disfunción sexual y con ello, una consecuente comorbilidad como depresión, ansiedad, alteraciones cardiovasculares, etc. lo que genera elevados costos en materia de salud

### OBJETIVO GENERAL

Evaluar la prevalencia de disfunción sexual en usuarias de métodos de planificación familiar

### HIPÓTESIS

Existe elevada prevalencia de disfunción sexual asociada a uso de métodos de planificación familiar que está infra diagnosticada.



## MATERIAL Y MÉTODOS O REPORTE DE CASO

Se realizó un estudio observacional analítico transversal con muestreo no probabilístico por conveniencia para el investigador, en donde se efectuó la encuesta de función sexual femenina del Dr. Froilán Sánchez a 377 mujeres en edad reproductiva de 15 a 44 años usuarias de anticonceptivos en la UMF 13. Se calcularon frecuencias, porcentajes, medida de tendencia central y se utilizó estadística inferencial para demostrar asociación a través de la prueba Chi cuadrada

## ASPECTOS BIOÉTICOS

Categoría 1. La encuesta se realizó bajo el Reglamento de la Ley General de Salud artículo 17 y la Declaración de Helsinki, no representando ningún riesgo para el paciente, su dignidad, bienestar o privacidad y previo consentimiento informado.

## RESULTADOS O ALCANCES Y LIMITACIONES

De las 377 pacientes la media de edad fue de 25-29 años. La prevalencia de disfunción sexual fue del 26%, el implante subdérmico con etonogestrel fue el método que presentó mayor prevalencia en el desarrollo de la misma en un 33.67%. El dominio de afectación de la función sexual más alterado fue el orgasmo, seguido de alteraciones en el deseo. 40.8% tenían IMC normal, 52.04% eran solteras, 42.85% cursaron bachillerato, el 27% era primigesta, 23.46% había tenido un parto, 23.46% una cesárea y 25.51% un aborto.

## CONCLUSIONES

La prevalencia de disfunción sexual es menor a la reportada a nivel nacional e internacional. No hubo asociación significativa estadística para la relación entre uso de anticonceptivos y disfunción sexual femenina.

**Palabras clave:** sexual, anticoncepción, orgasmo

## REFERENCIAS

- [1] Viviana Matute Ortega, Carlos Arévalo Peláez AEP. (Estudio Transversal: Prevalencia de Disfunción Sexual Femenina y Factores Asociados en Pacientes del Hospital "José Carrasco Arteaga".)



[Internet]. [cited 2020 Jul 23]. Available from: <http://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD42017.pdf>

- [2] Miranda, Vilma; Lara M. DISFUNCIÓN SEXUAL DE LA MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA. Rev Cient Esc Univ Ciencias la salud. 2017;4 (1):22–6
- [3] Iaplnskien L, Žilaitien B, Verkauskien R, Žalinkevi ius R, Bumbulien Ž, Vanagien V, et al. The effect of a drospirenone-containing combined oral contraceptive on female sexual function: a prospective randomised study. Eur J Contracept Reprod Heal Care. 2016;21(5)